

Protocolo de Profilaxia de Úlcera de Estresse

Unidade Clínica de Terapia Intensiva

Para a maioria dos pacientes internados na Unidade Clínica de Terapia Intensiva do Incor, a profilaxia para a úlcera de estresse está recomendada.

Indicações

- Ventilação mecânica por mais de 48 horas
- Coagulopatia (plaquetas abaixo de 50.000, INR > 1,5, TTPA > 2 vezes o controle)
- Sepses
- Choque
- Insuficiência hepática
- Insuficiência renal
- Transplantado
- Úlcera péptica ou sangramento gastrointestinal no último ano
- Tempo de permanência na UTI maior que uma semana

Agentes

- Para os pacientes que podem usar a via oral/enteral
Omeprazol 40mg 1x/dia
Ranitidina 150mg 2x/dia, como alternativa para os pacientes intolerantes ao inibidor da bomba de prótons.
- Para os pacientes que **não** podem usar a via oral/enteral
Pantoprazol 40mg IV 1x/dia
Omeprazol 40mg IV 1x/dia
Ranitidina 50mg IV 8/8 h
- Para pacientes em uso de clopidogrel
Alto risco de úlcera de estresse usa pantoprazol
Baixo risco de úlcera de estresse: ranitidina
Evitar omeprazol