

Absolutas

IAM recente, angina instável, arritmias cardíacas graves, pericardite ou miocardite aguda, endocardite, estenose aórtica grave, TEP recente, estenose mitral grave, dissecção aórtica, gravidez, lesão de tronco de coronária esquerda, cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva

Relativas

BAV avançado, marca-passo de frequência fixa, lesão equivalente de tronco, cardiomiopatia restritiva, doenças infecciosas agudas, anemia intensa, intoxicação medicamentosa, distúrbios metabólicos graves (cetoacidose diabética, insuficiência renal ou hepática, tireotoxicose ou mixedema), pós-operatório recente de cirurgia cardíaca, insuficiência cardíaca descompensada, insuficiência vascular periférica grave, hipertensão grave (PA sistólica > 200 mmHg e/ou PA diastólica > 110 mmHg) e qualquer incapacidade motora para realização do exercício

IAM = infarto agudo do miocárdio; TEP = tromboembolismo pulmonar; BAV = bloqueio atrioventricular; PA = pressão arterial.



Tabela 1.5 Otimizando o protocolo com o objetivo do teste ergométrico.

Objetivo	Protocolo mais indicado
Investigação de isquemia miocárdica	Ellestad, Bruce
Investigação de arritmias	Ellestad, Bruce
Avaliação da capacidade funcional	Rampa, Balke
Avaliação de marca-passo e do BAVTC	CAEP
Avaliação de crianças	Bruce, Rampa
Pós-IAM	Bruce modificado

BAVTC = bloqueio atrioventricular total congênito; IAM = infarto agudo do miocárdio.