



INSTITUTO DO CORAÇÃO

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP
SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR E IMAGEM MOLECULAR- ANDAR AB

Cintilografia Renal Dinâmica com Captopril

(Estudo Renal dinâmico / Renograma com Captopril)

Orientação ao paciente:

- Chegar com 30 minutos de antecedência, para verificação da documentação.
- Será fornecido um comprimido de captopril 01 hora antes do início do exame.
- Após 01 hora será injetado na veia o material específico (radiofármaco) para a aquisição das imagens com duração aproximada de 30 minutos.

Preparo:

- Suspender os medicamentos cardiológicos de uso contínuo somente após autorização de seu médico.
 - Suspender por 2 dias: Captopril (*Capoten, Hipocatril e Catoprol*), Losartan (*Cozaar, Corus, e Redupress*), Valsartan (*Diovan*)
 - Suspender por 3 dias: Lisinopril (*Zestril e Prinivil*), Ramipril (*Triatec*), Enalapril (*Renitec, Co-renitec, Eupressin, Atens, Neolapril e Vasopril*)
 - Suspender por 5 dias: Ibesartan (*Avapro e Aprovel*), Perindopril (*Coversyl*), Candesartan (*Atacand e Blopress*), Telmisartan (*Micardir e Pritor*), Fosinopril (*Monopril*), Trandolapril (*Odrik e Gopten*)
- Tomar 3 copos de água 1 hora antes do exame
- Não é necessário jejum

Tempo Total do Exame: 02 horas

Acompanhantes:

- Não são permitidos acompanhantes gestantes e crianças

Resultados:

- 5 dias úteis

Importante :

- Favor comunicar com 72 h de antecedência em caso de cancelamento do exame.



INSTITUTO DO CORAÇÃO

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP

Serviço de Medicina Nuclear e Imagem Molecular- Andar AB

- Se houver outros exames solicitados para medicina nuclear, um intervalo de 48 horas é obrigatório entre um exame e outro.
- **O EXAME NÃO DEVE SER REALIZADO EM MULHERES GRÁVIDAS OU EM FASE DE AMAMENTAÇÃO, POIS EXISTE A EMISSÃO DE UMA PEQUENA QUANTIDADE DE RADIAÇÃO.**