

Nota Técnica Serviço de Farmácia nº 233, de 10 de janeiro de 2024.

Assunto: Preparo de Vancomicina 500mg pó liofilizado frasco- ampola para administração **via oral**

Destinatário:

- Equipe médica;
- Equipe de Enfermagem;
- Equipe Farmacêutica.

O medicamento Vancomicina 500mg pó liofilizado na apresentação frasco-ampola pode ser utilizado por **via oral** para o tratamento de *Clostridioides difficile* e *Staphylococcus aureus* no trato gastrointestinal.

A dose utilizada mais comum é a de 125mg, sendo a frequência diária conforme prescrição médica e o período de tratamento do paciente. Abaixo, apresentamos as orientações para preparo do medicamento para via oral:

1. Reconstituir cada **1 frasco-ampola** de Vancomicina 500 mg com **10 mL de água** (Concentração final de 50mg/mL)
2. Administrar **por via oral** a dose de acordo com a frequência prescrita
A dose de 125 mg de Vancomicina equivale a 2,5mL da solução reconstituída
3. Armazenar o frasco-ampola já reconstituído sob refrigeração para administrar nas próximas doses - estabilidade de 14 dias sob refrigeração

Em caso de dúvidas, solicitamos que entre em contato com o Farmacêutico responsável:

Andar	Farmácia	Farmacêutico	Ramal
4º andar	Farmácia Internação	Dr. Luiz Otávio Westin	5943 / 4150
6º andar	Farmácia Internação	Dra. Luísa Fernanda Rossetto de Oliveira	5679
7º andar	Farmácia Beira Leito	Dra. Caroline Veloso Monreal	4913
		Dra. Isabelle Viana Dra. Talita Galdi	4914
7º andar	Farmácia Clínica	Dra. Andrea Bori Dra. Mariana Cappelletti Galante	5709
Assistência Farmacêutica Clínica		Dra. Julia Sumie Fugita Dr. Pedro Castelo Dra. Regina Machtura	5709

ELABORADO POR: Dra. Andressa Fernandes Data: 09/01/2024 Serviço de Farmácia	VERIFICADO POR: Dra. Mariana Galante Data: 09/01/2024 Serviço de Farmácia	APROVADO POR: Dra. Ana Lúcia Camargo Data: 09/01/2024 Diretora Serviço de Farmácia
---	---	--