

Nota Técnica Unidade de Farmácia nº 192, de 06 de abril de 2022.

Assunto: Substituição do medicamento ropivacaína 7,5 mg/mL por levobupivacaína 0,5% com hemitartrato de epinefrina 9,1 mcg/mL (equivale 5 mcg de epinefrina)

Destinatário:

- Médicos
- Equipe de Enfermagem
- Equipe Farmacêutica

Informamos que o medicamento “levobupivacaína 0,5% com hemitartrato de epinefrina 9,1 mcg/mL (equivale 5 mcg de epinefrina)” passará a ser fornecido como equivalente terapêutico em substituição ao medicamento “ropivacaína 7,5 mg/ml solução injetável ampola 20 mL”, em virtude do último processo licitatório de compra, conforme documento abaixo na página 2.

Em caso de dúvidas, solicitamos que entre em contato com o Farmacêutico responsável pelo atendimento da Unidade de Internação (quadro abaixo).

Andar	Farmácia	Farmacêutico	Ramal
4º andar	Farmácia Internação	Dr. Luiz Otávio Westin	5943 4150
6º andar	Farmácia Internação	Dra Ana Carolina C. N. Garcia	5679
7º andar	Farmácia Beira Leito	Dra Caroline Veloso Monreal Dr. José Coelho de Oliveira Júnior Dra Erika Cordeiro	4913 4914
7º andar	Farmácia Clínica	Dra. Andrea Bori Dra. Mariana Galante	5709
Assistência Farmacêutica Clínica		Dra. Isabelle Viana Dra. Julia Sumie Nakaima Fugita Dr. Pedro Castelo Dra. Regina Soares Machtura Dra. Thamiris Cardoso Santos	5709

ELABORADO POR: Dr. Valter Garcia Santos Data: 05/04/2022 Unidade de Farmácia	VERIFICADO POR: Drª Mariana Galante Data: 05/04/2022 Unidade de Farmácia	APROVADO POR: Dra. Sonia Lucena Cipriano Data: 05/04/2022 Unidade Farmácia
--	--	--

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

DA

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO

Folha de Informação rubricada sob nº _____ do processo nº _ GD nº 805416/2019


(a) _____

Ref. Solicitação de Alteração da Padronização de Medicamento nº 6/2019 - Cloridrato de Levobupivacaína


À
Divisão de Farmácia - ICHC
Através da Diretoria Clínica

A Câmara Técnica de Farmacologia - CTF, fundamentada em parecer do relator designado, aprovou a utilização do medicamento **Cloridrato de Levobupivacaína 0,5% em excesso enantiomérico de 50%(S75-R25) com vasoconstritor** a ser utilizado em bloqueios de plexos em pacientes submetidos a cirurgias como equivalente terapêutico do medicamento **ropivacaína 7,5 mg/ml solução injetável ampola 20 ml**, conforme critérios estabelecidos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticos.

CTF, em 17 de outubro de 2019.


Dra. Andréa Cássia Pereira Sforsin
Presidente da CTF

De acordo.


Professora Eloisa Bonfá
Diretora Clínica do HCFMUSP

/madpg

ELABORADO POR: Dr. Valter Garcia Santos Data: 05/04/2022 Unidade de Farmácia	VERIFICADO POR: Drª Mariana Galante Data: 05/04/2022 Unidade de Farmácia	APROVADO POR: Dra. Sonia Lucena Cipriano Data: 05/04/2022 Unidade Farmácia
--	--	--