


Nota Técnica Serviço de Farmácia nº 250, de 11 de setembro de 2024.

Assunto: Apresentações disponíveis do medicamento levodopa + benserazida




Destinatário:

- Equipe médica;
- Equipe de Enfermagem;
- Equipe Farmacêutica.


O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Parkinson do Relatório de Recomendação nº 291 indica o medicamento levodopa + benserazida como tratamento em diversas apresentações. No mercado, existem cinco apresentações, sem evidências clínicas que mostram superioridade entre elas, mas, com peculiaridades de uso.

Medicamento	Características
<p>Levodopa + benserazida (200 mg + 50 mg) comprimido (Prolopa®)</p>  <p>The image shows a box of Prolopa 200/50 mg tablets. The box is white with a purple band across the middle. Text on the box includes: 'Prolopa® levodopa + cloridrato de benserazida', '200/50 mg', 'Via oral USO ADULTO A PARTIR DE 25 ANOS', 'Contém: 30 comprimidos', and the Roche logo. A red band at the bottom says 'VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA'.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Comprimido de <u>liberação convencional</u>;• Pode ser partido para a administração;• Deve ser administrado 30 minutos antes ou 1 hora após as refeições, evitando o efeito competitivo da dieta proteica na absorção e tornando mais rápido o início da ação. <p><u>Medicamento padronizado para prescrição para pacientes internados e ambulatoriais.</u></p>

ELABORADO POR: Andressa Fernandes, Mariana de Sozzo Aleixo Data: 10/09/2024 Serviço de Farmácia	VERIFICADO POR: Mariana Galante Data: 10/09/2024 Serviço de Farmácia	APROVADO POR: Ana Lucia Camargo Data: 10/09/2024 Serviço de Farmácia
--	--	--

<p>Levodopa + benserazida (HBS) (100 mg + 25 mg) cápsula de liberação prolongada (Prolopa HBS®)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Hydrodynamically Balanced System</i> (HBS) é uma sigla para a apresentação de liberação prolongada das substâncias ativas no estômago por várias horas após a ingestão da cápsula; • Utilizado para controle de todos os tipos de flutuação motora; • Não tem a biodisponibilidade afetada pela interação com alimentos; • Não deve ser mastigada ou aberta. <p><u>Medicamento padronizado para prescrição para pacientes internados e ambulatoriais.</u></p>
<p>Levodopa + benserazida (100 mg + 25 mg) comprimido dispersível (Prolopa Dispersível®)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Comprimido para <u>necessidades imediatas</u> (início de ação 20 - 40 minutos); • Permite administração em pacientes com disfagia ou em uso de sonda de alimentação enteral; • Dissolver o comprimido em 25 - 50 ml de água filtrada, aguardar a dispersão e agitar antes de tomar. Observação: Após a dissolução tomar em 30 minutos. <p><u>Medicamento padronizado para prescrição para pacientes internados</u></p>
<p>Levodopa + benserazida BD (100 mg + 25 mg) comprimido (Prolopa BD®)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • A sigla BD remete a apresentação de <u>baixa dose</u>; • Pode ser partido para a administração; • Deve ser administrado 30 minutos antes ou 1 hora após as refeições, evitando o efeito competitivo da dieta proteica na absorção e tornando mais rápido o início da ação; • É possível substituí-lo por <u>MEIO comprimido</u> de levodopa + benserazida (200 mg + 50 mg), medicamento padronizado, pois, apresentam a mesma farmacocinética e farmacodinâmica. <p><u>Medicamento não padrão.</u></p>

<p>ELABORADO POR: Andressa Fernandes, Mariana de Sozzo Aleixo Data: 10/09/2024 Serviço de Farmácia</p>	<p>VERIFICADO POR: Mariana Galante Data: 10/09/2024 Serviço de Farmácia</p>	<p>APROVADO POR: Ana Lucia Camargo Data: 10/09/2024 Serviço de Farmácia</p>
--	---	---

<p>Levodopa + benserazida DR (200 mg + 50 mg) comprimido de liberação modificada (Prolopa DR®)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Liberação dupla (imediate e prolongada); • Pode ser partido sem alteração das características farmacocinéticas. <p><u>Medicamento não padrão.</u></p>
---	--

Fonte: Autoria própria, 2024.

Quadro resumo:

<p><u>Medicamento padronizado para prescrição para pacientes internados</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Levodopa + benserazida (HBS) (100 mg + 25 mg) cápsula de liberação prolongada (Prolopa HBS®)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Levodopa + benserazida (200 mg + 50 mg) comprimido (Prolopa®)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Levodopa + benserazida (100 mg + 25 mg) comprimido dispersível (Prolopa Dispersível®)</p> </div>	<p><u>Conciliação de medicamento de uso prévio</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>Levodopa + benserazida BD (100 mg + 25 mg) comprimido (Prolopa BD®) <u>Medicamento não padrão</u></p> <p>Prescrever MEIO comprimido de: Levodopa + benserazida (200 mg + 50 mg) comprimido (Prolopa®)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Levodopa + benserazida DR (200 mg + 50 mg) comprimido de liberação modificada (Prolopa DR®) <u>Medicamento não padrão</u></p> <p>Caso medicamento não possa ser substituído por uma apresentação padronizada, verificar com a equipe a melhor conduta.</p> </div>
<p><u>Medicamento padronizado para prescrição para pacientes ambulatoriais</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Levodopa + benserazida (HBS) (100 mg + 25 mg) cápsula de liberação prolongada (Prolopa HBS®)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Levodopa + benserazida (200 mg + 50 mg) comprimido (Prolopa®)</p> </div>	

<p>ELABORADO POR: Andressa Fernandes, Mariana de Sozzo Aleixo Data: 10/09/2024 Serviço de Farmácia</p>	<p>VERIFICADO POR: Mariana Galante Data: 10/09/2024 Serviço de Farmácia</p>	<p>APROVADO POR: Ana Lucia Camargo Data: 10/09/2024 Serviço de Farmácia</p>
--	---	---

Fonte: Autoria própria, 2024.

Em caso de dúvidas, solicitamos que entre em contato com a Equipe Farmacêutica:

Andar	Farmácia	Ramal
4º andar Bloco I	Farmácia Internação	5943
6º andar Bloco II	Farmácia Internação	5679
7º andar Bloco I	Farmácia Beira Leito	4913 4914
7º andar Bloco II	Assistência Farmacêutica Clínica	5709
8º andar Bloco II	Central de Avaliação de Prescrição	5020

Referências bibliográficas:

1. Relatório de Recomendação nº 291, Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Parkinson, agosto de 2017, disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/relatorio_pcdt_doenca_de_parkinson_final_291_2017.pdf. Acesso em: 14 ago. 2024.
2. PROLOPA (levodopa + cloridrato de benserazida). Diálogo Roche: Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A, 2024. p. 24. Disponível em: <https://dialogoroche.com.br/content/dam/roche-dialogo/dialogo-brazil-assets/downloadable-assets/produtos/bulas/prolopa/prolopa-bula-para-profissionais.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2024.

ELABORADO POR: Andressa Fernandes, Mariana de Sozzo Aleixo Data: 10/09/2024 Serviço de Farmácia	VERIFICADO POR: Mariana Galante Data: 10/09/2024 Serviço de Farmácia	APROVADO POR: Ana Lucia Camargo Data: 10/09/2024 Serviço de Farmácia
--	--	--